



## ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

### ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (ОСН)



**Острая сердечная недостаточность (ОСН) – это тяжёлое патологическое состояние, которое развивается у больных с различными заболеваниями сердца и гипертонической болезнью.** Это одна из наиболее частых причин вызова скорой медицинской помощи и госпитализации больных и поэтому надо помнить, что:

**Основными проявлениями (симптомами) острой сердечной недостаточности являются:**

- Тяжёлое, частое (более 24 в минуту) шумное дыхание – одышка, иногда достигающая степени удушья, с преимущественным затруднением вдоха и явным усилением одышки. Сидячее положение или лежачее положение с высоко поднятым изголовьем облегчает состояние больного.
- Часто при дыхании становятся слышны влажные хлопающие хрипы/звуки, прерываемые кашлем.
- Больному характерна сидячая поза с упором прямыми руками в колени.

### **МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

При появлении у больных гипертонической болезни или болезни сердца (но не лёгких или бронхов) вышеуказанных симптомов ОСН необходимо:



1. Вызвать немедленно скорую медицинскую

ПОМОЩЬ

**103** или **03** – со стационарного телефона

**112** – с мобильного телефона.

2. Придать больному сидячее положение, лучше в

кресле с подлокотниками, на которые он может

опираться и задействовать межрёберные мышцы

в акт дыхания.

3. Обеспечить физический и психоэмоциональный покой и свежий воздух.

4. В крайне тяжёлых случаях на ноги в области паха накладываются жгуты, передавливающие поверхностные вены, но не глубокие артерии, что уменьшает приток крови к сердцу и тем самым облегчает его работу.

5.



При наличии опыта по применению нитроглицерина у больного или человека, оказывающего первую помощь, его назначают в дозе 0,5 мг под язык (ингаляцию в полость рта производят под корень языка), капсулу необходимо предварительно раскусить, не глотать. При улучшении самочувствия больного после применения нитроглицерина, его применяют повторно, через каждые 5-10 минут до прибытия бригады скорой медицинской помощи. При отсутствии улучшения самочувствия больного после применения

нитроглицерина, его больше не применяют.

**ВНИМАНИЕ!**

***Больному с ОСН категорически запрещается вставать, ходить, курить, пить воду и принимать жидкую пищу до особого разрешения врача.***

***Нельзя принимать нитроглицерин при артериальном давлении менее 100 мм.рт.ст., при выраженной головной боли, головокружении, остром нарушении зрения, речи или координации движений.***

***Всем больным с гипертонической болезнью или болезнью сердца с наличием одышки и отёков на ногах необходимо обсудить с лечащим врачом, какие препараты необходимо принимать при развитии ОСН, чётко записывать их наименования, дозировку и временную последовательность их приёма, а также уточнить у врача, при каких проявлениях болезни необходимо срочно вызывать скорую медицинскую помощь. Каждому такому больному необходимо сформировать индивидуальную аптечку первой помощи при ОСН и постоянно иметь её при себе.***

Материал подготовлен

редакционно-издательским отделом

ГБУЗ АО «ЦМП» - 2017г.